*Ce recueil d'informations a été élaboré pour aider modestement les étudiants de seconde année de Médecine dans le cadre de leurs efforts afin d'acquérir les compétences nécessaires à leur formation.*

*Il ne doit en aucun cas faire l'objet d'avantages pécuniaires.*

*Je me décharge de toute responsabilité en cas de détournement du document de sa quintessence originelle.*

*Allégrement, Nazih Mohamed Zakari KOUIDRAT.*

# Le jéjuno-iléon :

**Le jéjuno-iléon :**

- Fait suit au duodénum (jonction duodéno-jéjunale), et se termine au niveau du caecum (jonction iléo-caecale ou iléo-colique).

- Il mesure 6 m de long, il est constitué par les anses intestinales appelées **flexuosités**.

- Il est divisé en 2 parties :

  - Le jéjunum : en haut et à gauche.
  - L'iléon : en bas et à droite.

**Moyens de fixité :**

- le jéjuno-iléon est relié à la paroi postérieure par le **mésentère**.


- Le mésentère est un repli péritonéal qui fixe le jéjuno-iléon à la paroi abdominale.


- Il présente 2 segments :

  - Un segment libre : mobile intestinal qui mesure 6m.
  - Un segment fixe : la racine du mésentère qui mesure 15 cm, elle est fixée en avant du processus incinatus et de D3. Elle est oblique de gauche à droite et de haut en bas de L2 à la fosse iliaque droite.

- Il est vascularisé par l'artère et la veine mésentériques supérieures. Elles donnent les collatérales suivantes :

- Les artères et veines intestinales.
- Les arcades vasculaires de $1^{er}$ $2^{e}$ et $3^{e}$ ordre.
- Les vaisseaux droits.




**Source :** cours du Pr HAMMOUDI